

Autorzy: Marek Karas

Departament Chirurgii Szczekowo-Twarzowej, Al Qassimi Hospital, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie

W pogoni za szkliwiakiem

Szkliwiak trzonu zuchwy u 30-letniego pacjenta .

- a. segmentalna resekcja z zachowaniem ciaglosci trzonu zuchwy
- b. po 3 latach - wznowa w obrebie nowopowstalej kosci w ubytku poresekcyjnym
- c. pacjent pozostaje poza kontrola przez 2 lata
- d. hemiresekcja zuchwy z jednoczasowa rekonstrukcja przeszczepem kostnym
- e. 6 tygodni po zabiegu - infekcja skorna doprowadza do zainfekowania przeszczepu kostnego
- f. 6 miesiecy pozniej dochodzi o czesciowego odsloniecia plyty tytanowej
- g. pacjent "unika" zabiegu przez poltora roku
- h. usuniecie plyty tytanowej i martwaka, przeszczep funkcjonuje prawidlowo
- i. po 8 latach stwierdzono obecosc tobielowatego guza wychodzacego z przeszczepu
- j. resekcja (wgojonego) przeszczepu wraz z guzem, ponowna rekonstrukcja
badanie HP : szkliwiak