

Efekty funkcjonalne i ocena jakości życia u pacjentów po rekonstrukcjach ubytków ponowotworowych wargi dolnej

Wstęp:

Prawidłowa rekonstrukcja ubytku wargi dolnej warunkuje zadawalający efekt funkcjonalny oraz zapewnia dobrą jakość życia pacjentów.

CEL:

Retrospektywna ocena metod rekonstrukcji wargi dolnej po resekcjach z powodu nowotworów.

Materiał i Metoda:

Spośród 141 pacjentów operowanych z powodu raka wargi dolnej w latach 2010-2017 przeprowadzono badania ankietowe na grupie 42 chorych. Średnia wieku wynosiła 72,3 (od 37 do 92), w tym 33 mężczyzn i 9 kobiet. Do oceny wyników operacji rekonstrukcyjnej wargi dolnej użyto skali ślinienia wykorzystywanej w chorobie Parkinsona oraz Kwestionariusza EORTC QLQ-C30.

Wyniki:

13 pacjentów podawało wykluczenie z życia towarzyskiego z powodu przebytego zabiegu w Ankiecie QLQ. Chorzy z rekonstrukcją płatem chińskim zgłaszali spadek jakości życia ze względu na osłabienie funkcji motorycznej przedramienia po pobraniu płata. Jakość życia pacjentów po rekonstrukcjach płatem chińskim, metodą Karapendzicia lub Webstera była istotnie statystycznie mniejsza niż w grupie z wykonaną plastyką W-Y lub V. Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy pomiędzy ocenami z ankiety ślinienia pomiędzy rekonstrukcjami wykonanymi różnymi technikami.

Wnioski:

Rozległe zabiegi rekonstrukcji wargi dolnej powiązane z rozleglejszymi resekcjami wiążą się z obniżeniem jakości życia pacjentów niezależnie od stosowanej techniki operacyjnej. Ankieta ślinienia wydaje się być nieprzydatna w ocenie jakości wykonanych operacji rekonstrukcyjnych.